

Hemangioma cavernoso: curiosa apresentação na mama

Cavernous hemangioma: curious presentation in the breast

Sandra Regina Campos Teixeira¹, Maurício de Souza Arruda², Juliana Azevedo³,
Marcia Martos Amâncio de Camargo⁴, Júlia Yoriko Shinzato⁵

Hemangiomas são tumores vasculares benignos, respondendo por cerca de 0,4% de todos os tumores mamários^{1,2}, com rara malignização. Tem difícil diagnóstico por imagem por ausência de características específicas, podendo ser confundido com tumor maligno^{1,3,4}.

O crescimento da lesão apresentada nas Figuras 1 a 3 após longa estabilidade pode ter sido em decorrência de sangramento, comum principalmente quando essa patologia acomete outros órgãos.




Figura 1. Paciente 71 anos, assintomática. Mamografia de 2 de setembro de 2014: nódulo circunscrito de 1,6 x 1,4 cm na mama direita (D), descrito em 2011 como estável desde 2007




Figura 2. Mamografia de 2011. Na ocasião não foi encontrada correlação ecográfica. Exames não disponíveis entre 2011 e 2014 (paciente não lembra se fez ou os perdeu). A comparação com este exame mostra aumento significativo da lesão

Trabalho realizado na Clínica CDE Diagnóstico por Imagem, especializada em diagnóstico mamário – Campinas (SP), Brasil.

¹Médica Radiologista da Clínica CDE Diagnóstico por Imagem – Campinas (SP), Brasil.

²Médico Ultrassonografista e Mamografista da Clínica CDE Diagnóstico por Imagem; Mestre e Doutor pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – Campinas (SP), Brasil.

³Médica Ultrassonografista e Mamografista da Clínica CDE Diagnóstico por Imagem – Campinas (SP), Brasil.

⁴Médica Ultrassonografista da Clínica CDE Diagnóstico por Imagem – Campinas (SP), Brasil.

⁵Professora Doutora Assistente do Departamento de Tocoginecologia do Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemio Pinotti – CAISM/UNICAMP – Campinas (SP), Brasil.

Endereço para correspondência: Sandra Regina Campos Teixeira – Rua Lauro Vannucci, 851, casa 16 – Santa Cândida – CEP: 13080-548 – Campinas (SP), Brasil – E-mail: santx@icloud.com

Conflito de interesses: nada a declarar.

Recebido em: 09/12/2014. **Aceito em:** 28/01/2015




Figura 3. Ultrassonografia: nódulo sólido de 1,7 x 1,1 x 1,3 cm, lobulado, heterogêneo, com microáreas císticas e sinal vascular leve ao Doppler (suspeito por crescimento BI-RADS 4). Biópsia de fragmento: hemangioma cavernoso

Referências

1. Funamizu N, Tabei I, Sekine C, Fuke A, Yabe M, Takeyama H, et al. Breast hemangioma with difficulty in preoperative diagnosis: a case report. *World J Surg Oncol.* 2014;12:313.
2. Smythe FW. Brief Communication: Intramammary Hemangioma. *Ann Surg.* 1942;115(4):716-9.
3. Vieira SC, Silva SJ, Madeira EB, França JCQ, Martins Filho SN. Hemangioma de mama simulando metástase no PET-CT. *Radiol Bras.* 2011;44(6):401-2.
4. Puerta AF WC, Rodríguez PA, Romero JA. Mammographic, ultrasonographic and histopathological appearances of cavernous hemangioma of the breast: one case report. *Rev Argent Radiol.* 2011;75(2):119-22.